

Cuadro 3 Número anual de defunciones por distintas causas en menores de 5 años en las regiones de la OMS, estimaciones para 2000–2003^a

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

Causa	TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS		ÁFRICA		LAS AMÉRICAS		ASIA SUDORIENTAL		EUROPA			MEDITERRÁNEO ORIENTAL		PACÍFICO OCCIDENTAL												
	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	Todos	Estados Miembros con baja mortalidad ^b	Otros	Todos	Estados Miembros con baja mortalidad (Australia, Japón y Nueva Zelanda)	Otros	(000)	% total	(000)	% total								
Población (000)	616 764		110 944		77 885		22 978		54 908		178 987		50 738		22 050		28 688		67 918		130 292		7 833		122 459	
TOTAL Defunciones	10 596	100	4 396	100	439	100	50	100	389	100	3 070	100	263	100	25	100	238	100	1 409	100	1 020	100	7	100	1 013	100
VIH/SIDA	321	3	285	6	6	1	0	0	6	2	22	1	1	0	0	0	1	0	4	0	3	0	0	0	3	0
Enfermedades diarreicas ^c	1 762	17	701	16	51	12	0	0	51	13	552	18	35	13	0	0	35	15	245	17	178	17	0	0	178	18
Sarampión	395	4	227	5	1	0	0	0	1	0	103	3	2	1	0	0	1	1	52	4	11	1	0	0	11	1
Malaria	853	8	802	18	1	0	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	37	3	1	0	0	0	1	0
Infecciones respiratorias agudas	2 027	19	924	21	54	12	1	2	53	14	590	19	32	12	0	2	31	13	292	21	137	13	0	4	137	13
Causas neonatales ^d	3 910	37	1 148	26	195	44	29	58	166	43	1 362	44	116	44	14	55	102	43	610	43	480	47	3	43	477	47
Traumatismos	305	3	76	2	23	5	5	10	18	5	71	2	17	7	2	7	16	7	45	3	73	7	1	12	72	7
<i>No intencionados</i>	291
Accidentes de tránsito	50
Ahogamientos	60
<i>Intencionados</i>	14
Otros	1 022	10	233	5	109	25	15	30	94	24	359	12	61	23	9	36	52	22	124	9	137	13	3	40	134	13

^aRespecto a las fuentes y los métodos, véanse las notas explicativas.^bAlemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, San Marino, Suecia, Suiza, Reino Unido y República Checa.^cIncluye sólo las defunciones por diarrea durante el periodo posneonatal.^dLas causas neonatales comprenden los casos de diarrea durante el periodo neonatal (véase el cuadro 4). A nivel mundial, la proporción de defunciones por diarrea respecto al total entre todos los niños menores de 5 años es del 18%.

... No disponible.

Cuadro 4 Número anual de defunciones por distintas causas en recién nacidos en las regiones de la OMS, estimaciones para 2000–2003^a

Cifras calculadas por la OMS para asegurar la comparabilidad; no coinciden necesariamente con las estadísticas oficiales de los Estados Miembros, que pueden emplear a ese fin otros métodos rigurosos.

Causa	TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS		ÁFRICA		LAS AMÉRICAS		ASIA SUDORIENTAL		EUROPA			MEDITERRÁNEO ORIENTAL		PACÍFICO OCCIDENTAL												
	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	(000)	% total	Todos	Estados Miembros con baja mortalidad ^b	Otros	Todos	Estados Miembros con baja mortalidad (Australia, Japón y Nueva Zelanda)	Otros	(000)	% total	(000)	% total								
TOTAL Defunciones neonatales	3 910	100	1 148	100	195	100	29	100	166	100	1 362	100	116	100	14	100	102	100	610	100	480	100	3	100	477	100
Tétanos neonatal	257	7	108	9	2	1	0	0	2	1	58	4	1	1	0	0	1	1	72	12	16	3	0	0	16	3
Infección grave ^c	1 016	26	313	27	34	17	2	6	32	19	374	27	21	18	1	6	20	20	174	28	101	21	0	6	101	21
Asfixia del parto	894	23	274	24	36	19	4	14	33	20	314	23	21	18	2	15	19	18	122	20	127	26	0	14	126	26
Enfermedades diarreicas	108	3	40	3	1	1	0	0	1	1	37	3	1	1	0	0	1	1	22	4	7	1	0	0	7	1
Malformaciones congénitas	294	8	70	6	31	16	8	29	22	13	77	6	21	19	4	32	17	17	54	9	40	8	1	31	39	8
Parto prematuro ^d	1 083	28	265	23	78	40	13	45	65	39	413	30	44	38	6	41	38	37	132	22	152	32	1	44	151	32
Otros	258	7	78	7	13	7	2	7	11	7	89	7	7	6	1	6	6	6	35	6	36	8	0	7	36	8

^aRespecto a las fuentes y los métodos, véanse las notas explicativas.^bAlemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, San Marino, Suecia, Suiza, Reino Unido y República Checa.^cIncluye defunciones por neumonía, meningitis, septicemia y demás infecciones ocurridas durante el periodo neonatal.^dIncluye sólo las defunciones directamente atribuibles a la prematuridad y a complicaciones específicas de la prematuridad como la carencia de agente tensioactivo, no todas las defunciones de lactantes prematuros.